Инструкция Грудной сбор №4

Лекарственная форма

Специально для сайта MyKashel.ru

Сбор порошок

Состав

Ромашки цветков	20%
Багульника болотного побегов	20%
Ноготков цветков	20%
Фиалки травы	20%
Солодки корней	15%
Мяты перечной листьев	5%

Описание

Действующие Смесь неоднородных частиц растительного сырья коричневато-желтого цвета с зелеными, белыми, желто-оранжевыми и коричневыми вкраплениями. Запах ароматный. Вкус водного извлечения горьковато-сладкий, слегка холодящий

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающее средство растительного происхождения

Фармакологическое действие

Настой оказывает отхаркивающее и противовоспалительное действие

Показания к применению

В комплексной терапии при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в том числе бронхит, трахеит)

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет

Применение при беременности, в период грудного вскармливания

Не рекомендуется без согласования с лечащим врачом, в связи с отсутствием достаточных данных клинических наблюдений.

Способ применения и дозы

1 фильтр-пакет (2,0 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают крышкой и настаивают 15 минут, периодически надавливая на пакетик ложкой, затем его отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Принимают внутрь до еды в течение 2-3 недель: взрослые и дети старше 12 лет – по ½ стакана 4 раза в день, дети от 6 до 12 лет – по 2-3 столовые ложки 4 раза в день, дети от 3 до 5 лет – по 1-2 столовые ложки 4 раза в день.

При хорошей переносимости для приготовления настоя можно 2 фильтр-пакета заливать 100 мл (1/2 стакана) кипятка и принимать полученный настой до еды в течение 2-3 недель: взрослые и дети

старше 12 лет – по ½ стакана 3 раза в день, дети от 6 до 12 лет – по 2-3 столовые ложки 3 раза в день, дети от 3 до 5 лет – по 1-2 столовые ложки 3 раза в день.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции

Передозировка:

До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы