

Линкас

Латинское название: Lincus

Код АТХ: R05CA10

Действующее вещество: Комбинация растительных ингредиентов

Производитель: Хербион, Пакистан

Условия отпуска из аптеки: Без рецепта

## **Специально для сайта MyKashel.ru**

Линкас представлен продуктивным комбинированным средством на основе природных компонентов. Препарат помогает справляться с кашлем, обладает хорошим отхаркивающим и муколитическим действием, проявляет умеренный противовоспалительный эффект. Медикамент имеет несколько удобных форм выпуска, назначается как взрослым пациентам, так и малышам. Практически не сказывается отрицательными явлениями.

Показания к применению

Предписанием к назначению Линкса являются такие патологии:

- Острые респираторные инфекции
- Различные формы бронхита
- Грипп
- Трахеит
- Ларингит
- Пневмония.

Помимо этого, лекарство обладает хорошей эффективностью при сухом кашле у тех, кто много курит.

Состав препарата

Основа: сухой экстракт адхадоты сосудистой, корней солодки, корней и плодов перца, фиалки душистой, иссопа лекарственного, корней и корневищ альпинии галанга, плодов кордии широколистной, алтея лекарственного, плодов зизифуса, листья и цветы оносмы прицветковой.

Дополнение: сахароза, кислота лимонная, глицерин и некоторые другие вещества.

## Лечебные свойства

Лекарственное средство Линкас вследствие своей уникальной основы проявляет антисептическое, отхаркивающее и противовоспалительное действие. Помимо этого, при помощи Линкаса можно значительно уменьшить болевые проявления. При кашле у больных отмечается разжижение и облегчение вывода мокроты, облегчается дыхание, проходит головная боль. Лекарство практически не попадает в кровь, отличается системным действием.

## Формы выпуска

Линкас сироп от кашля представляет собой жидкость коричневатого оттенка, с незначительным запахом. Отпускается в стеклянных флаконах по 90 и 120 мл.

Линкас балм – наружная мазь, предлагается в полиэтиленовом флаконе по 25г, размещенного в пачке картонной.

Линкас ОРВИ представлен гранулами, упакованными в саше-пакеты по 5 и 6 г. В упаковке может находиться 5 или 10 пакетов.

Линкас пастилки лор – круглые карамельные таблетки, коричневатого оттенка, с лимонно-медовым вкусом. Упакованы в блистере по 8 штук, в пачке 2 блистера.

## Способ применения

Линкас сироп рекомендован внутренне. Линкас для детей от 6 месяцев до 6 лет полагается пить по ½ чайной ложке 3 раза в сутки. От 3 до 8 лет ребенку нужно пить по 1 чайной ложке 3 раза в день. От 8 лет и взрослым – по 2 чайной ложке на протяжении суток. Продолжительность лечения варьируется от 5-7 дней. При необходимости дальнейший курс определяет специалист.

Линкас балм практикуется для наружных целей. При сильном кашле Линкас бальзам накладывают на грудь и хорошо втирают. Данная процедура проводится 3-4 раза в день, на протяжении недели. При болезненности в мышцах, возникшей на фоне сильного кашля, мазью пользуются 4-5 раз в

день, нанося ее на болезненные участки, длительность терапии 5-7 дней. Для большей эффективности при нанесении Линкас балм мази можно воспользоваться теплым шарфом или пледом, прикрыв участки, с нанесенной мазью.

Линкас ОРВИ предназначен для изготовления раствора, который принимают перорально. Содержимое пакета (гранулы) растворяют в 200 мл теплой воды и принимают по 2-3 раза в день, после еды. Лечение длится на протяжении 7-9 дней.

Линкас лор инструкция по применению рекомендует рассасывать пастилки через 3-4 часа. Максимальная дозировка должна составлять не больше 8 леденцов. Средний курс терапии – 3-5 дней.

При беременности и грудном вскармливании

Воздействия средства при беременности полностью не изучено, поэтому его применение в данный период крайне не желательно. При лактации от его использования также стоит отказаться.

Противопоказания

Не разрешается применять медикамент при высокой чувствительности к его составляющим, а также детям до 6 месяцев.

Меры предосторожности

С особой осторожностью назначается больным с сахарным диабетом.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Крайне не желательно использовать от кашля Линкас в сочетании с аналогичными противокашлевыми средствами.

В определенных ситуациях назначается комбинированный прием.

Побочные эффекты

Иногда возможны проявления аллергии: кожная сыпь, зуд и пр.

Передозировка

Данные о превышении дозы не известны.