

Специально для сайта **MyKashel.ru**

## Пектусин таблетки №10



**Действующее вещество:** Комбинации

**Лекарственная форма:** Таблетки

**Фармакотерапевтическая группа:** Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.

### Состав лекарственного средства

*действующие вещества:* 1 таблетка содержит ментола 0,004 г, масла эвкалипта 0,0005 г;

*вспомогательные вещества:* сахар, натриевая соль КМЦ, кальция стеарат, тальк очищенный.

### Лекарственная форма

Таблетки.

Таблетки белого цвета со сладко-охлаждающим вкусом и специфическим запахом.

### Название и местонахождение производителя

Одесское производственное химико-фармацевтическое предприятие "Биостимулятор" в форме общества с ограниченной ответственностью.

Украина, 65006, м. Одеса, Хаджибейська дорога, 2.

### Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТС R05C A10.

*Фармакологические свойства.*

Пектусин относится к лекарственным средствам, которые раздражают преимущественно чувствительные (афферентные) нервные окончания слизистых оболочек полости рта.

Оказывает противовоспалительное и антимикробное действие.

## **Показания для применения**

Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей (тонзиллиты, ларингиты, фарингиты, трахеиты, бронхиты).

## **Противопоказания**

Спазмофилия, стенозирующий ларинготрахеит, сахарный диабет, повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 7 лет. Бронхиальная астма.

## **Особенности применения**

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Разрешается применять лекарственное средство в период беременности и кормления грудью с учетом соотношения риск/польза.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами**

Препарат не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

## **Дети**

Препарат противопоказан детям в возрасте до 7 лет.

## **Способ применения и дозы**

Взрослым и детям старше 7 лет назначают по 1 таблетке под язык (держат во рту до полного рассасывания) 3 - 4 раза в день. Продолжительность применения обусловлена характером заболевания, достигнутым терапевтическим эффектом.

## **Передозировка**

Не описанное.

## **Побочные эффекты**

Могут наблюдаться местные аллергические реакции (крапивница, зуд).

*В случае возникновения любых необычных реакций обязательно посоветуйтесь с врачом относительно дальнейшего применения препарата!*

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не установлена.

## **Срок годности**

3 года.

Не применяйте препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре 15-25 °С.

### **Упаковка**

Таблетки № 10 в стрипах.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

Внимание! Текст описания препарата "Пектусин таблетки №10" предоставлен для общей информации и ознакомления и является упрощённым вариантом официальной аннотации к лекарству. Перед приобретением и использованием препарата обязательно обратитесь к врачу и получите профессиональные рекомендации. Данный текст размещён на портале сугубо для ознакомительных целей и не может служить основанием для самолечения. Только врач может выносить решение о назначении того или иного лекарства, определять дозу и график приёма.