Специально для сайта MyKashel.ru

Форма выпуска, состав и упаковка ПРОСПАН

капли д/приема внутрь 2 г/100 мл: фл. 20 мл

Рег. №: № 9429/10 от 24.09.2010 - Действующее

Капли для приема внутрь *темно-коричневого цвета, с запахом спирта и фенхеля; в процессе хранения возможно образование небольшого помутнения иосадка.*

Фармакологическое действие ПРОСПАН

Препарат растительного происхождения от кашля.

Оказывает отхаркивающее, муколитическое и спазмолитическое действие, обусловленное содержанием гликозидных сапонинов. Снижает вязкость мокроты и способствует ее отхождению.

Показания к применению ПРОСПАН

— в качестве отхаркивающего средства в терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и легких, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой;

— симптоматическое лечение хронических воспалительных заболеваний бронхов, в комплексной терапии острых респираторных инфекции, сопровождающихся кашлем (Проспан® сироп).

Режим дозирования ПРОСПАН

Капли для приема внутрь

Детям в возрасте 1-3 лет *препарат назначают по 10 капель 3-5 раз/сут;* **детям 4-7 лет** *- по 15 капель 3-5 раз/сут;* **детям школьного возраста и взрослым** *- по 20 капель 3-5 раз/сут.*

Капли следует принимать перед приемом пищи. Маленьким детям рекомендуется давать капли с небольшим количеством воды.

Курс лечения определяется тяжестью заболевания, минимальный курс лечения должен составлять 1 неделю.

Для закрепления терапевтического эффекта рекомендуется после исчезновения симптомов болезни продолжить лечение еще в течение 2-3 дней.

Ингаляционная терапия с применением препарата Проспан®

Для проведения ингаляций с использованием капель Проспан® пригодны все стандартные устройства и приборы для распыления без нагрева. Для предотвращения побочных эффектов раздражения вследствие содержания этанола в препарате, Проспан® можно разбавить для ингаляций питьевой водой в соотношении 1:2.

В специальный ингаляционный прибор накапать 20-25 капель препарата и развести питьевой водой комнатной температуры в соотношении 1:2. Ингаляции проводить 3-5 раз/сут.

Побочное действие ПРОСПАН

В случае употребления препаратов, содержащих плющ, возможны следующие побочные реакции.

Аллергические реакции: очень редко - диспноэ, отек Квинке, экзантема, крапивница.

Со стороны пищеварительной системы: очень редко - тошнота, рвота, диарея.

Противопоказания к применению ПРОСПАН

— алкоголизм и другие состояния, при которых противопоказан прием алкоголя (капли для приема внутрь);

— детский возраст до 1 года (капли для приема внутрь);

— детский возраст до 2 лет (сироп);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью ПРОСПАН

Проспан® капли для приема внутрь: т.к. не проводились исследования с целью выснить возможность применения препарата при беременности и в период грудного вскармливания, препарат можно применять только после предварительной консультации с врачом.

Особые указания ПРОСПАН

Не следует превышать рекомендуемую дозу препарата.

При отсутствии улучшения состояния, а также в случае возникновения указанных выше побочных реакций, необходима консультация врача.

В каплях для приема внутрь содержится 47 об.% этанола; не содержится сахара, консервантов и красителей. В процессе хранения возможно легкое помутнение жидкости, образование осадка и незначительные изменения вкуса, что не влияет на терапевтическое действие препарата.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Передозировка ПРОСПАН

Прием препарата в дозе, значительно превышающей рекомендованную суточную дозу (больше чем в 3 раза) может вызвать тошноту, рвоту и диарею. В этом случае пациент должен обратиться к врачу.

Лекарственное взаимодействие ПРОСПАН

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, т.к. это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Условия отпуска из аптек ПРОСПАН

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ПРОСПАН

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Срок годности капель для приема внутрь - 4 года.

После вскрытия упаковки сироп можно применять в течение 3 месяцев.