


ИНСТРУКЦИЯ по применению препарата

Специально для сайта **MyKashel.ru**

КАШНОЛ®



Регистрационный номер: П N 014296/01

Торговое название: КАШНОЛ®

Международное непатентованное название: -

Лекарственная форма: сироп

Состав препарата

Сироп: 5 мл сиропа (одна чайная ложка) содержит активные вещества:

Сальбутамола сульфат 1 мг

Бромгексина гидрохлорид 2 мг

Гвайфенезин 50 мг

Ментол 0,5 мг

Вспомогательные вещества: сахароза, кислота лимонная моногидрат, натрия эдетат, натрия бензоат, калия сорбат, пропиленгликоль, глицерин, раствор сорбитола 70%, пунцовый 4R, ароматизатор малиновый.

Описание: жидкость красного цвета с запахом малины и сладким вкусом.

Фармакотерапевтическая группа (по АТС): R05CB10

Комбинированный препарат. Бронхолитическое, муколитическое, отхаркивающее средство.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, состоящий из ингредиентов, применяемых для симптоматического лечения кашля при различных легочных заболеваниях. Обладает бронхолитическим, муколитическим и отхаркивающим действием.

Сальбутамол оказывает бронхолитическое действие путем селективного действия на бета-2-адренергические рецепторы бронхов.

Бромгексин разжижает мокроту, увеличивает ее объем. Муколитическое действие обусловлено способностью деполимеризовать и разжижать мукопротеины и мукополисахаридные волокна.

Гвайфенезин обладает отхаркивающим действием. Уменьшает адгезивность, поверхностное натяжение мокроты, что улучшает ее отхождение.

Ментол обладает слабым антисептическими свойствами оказывает успокаивающее действие и уменьшает раздражение слизистой оболочки дыхательных путей.

Показания к применению:

Острые и хронические бронхолегочные заболевания, сопровождающиеся затруднением отхождения мокроты (бронхиальная астма, трахеобронхит, обструктивный бронхит, пневмония, эмфизема легких, пневмокониоз и др.).

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; беременность, период лактации, тахикардия, миокардит, пороки сердца, декомпенсированный сахарный диабет, тиреотоксикоз, глаукома, печеночная или почечная недостаточность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, дефицит сахарозы/изомальтозы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (т.к. препарат содержит сахарозу и сорбитол).

Предупреждения:

Препарат Кашнол следует осторожно применять у пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии. При необходимости лечения Кашнолом в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

Способ применения и дозы:

Препарат Кашнол назначают взрослым и детям старше 12 лет по 10 мл (2 чайные ложки) 3 раза в день,

детям до 6 лет - по 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза в день,

детям от 6 до 12 лет - по 5-10 мл (1-2 чайные ложки) 3 раза в день.

Между применением очередных доз препарата необходим перерыв не менее 6 часов.

Побочное действие:

Иногда наблюдаются головная боль, головокружение, повышенная нервная возбудимость, нарушение сна, сонливость, тремор, судороги, тошнота, рвота, диарея, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, учащенное сердцебиение, возможно окрашивание мочи в розовый цвет, аллергические реакции (сыпь, крапивница), снижение артериального давления, коллапс.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Другие бета-2-адреномиметические средства и теofilлин усиливают действие сальбутамола и увеличивают вероятность появления побочных эффектов.

Кашнол не назначают одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другими противокашлевыми средствами, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

Входящий в состав препарата Кашнол бромгексин способствует проникновению антибиотиков (эритромицин, цефалексин, окситетрациклин) в легочную ткань.

Не рекомендуется применять препарат Кашнол одновременно с неселективными блокаторами бета-адренорецепторов, такими как пропранолол.

Входящий в состав препарата Кашнол сальбутамол не рекомендуется пациентам, которые получают ингибиторы МАО.

Диуретики и препараты глюкокортикостероидов усиливают гипокалиемический эффект сальбутамола.

Не рекомендуется принимать одновременно с Кашнолом щелочное питье.

Передозировка:

О случаях передозировки не сообщалось. Возможно усиление вышеуказанных побочных эффектов. Лечение симптоматическое.

Форма выпуска:

Сироп.

По 100 или 200 мл во флакон темного стекла, укупоренный завинчивающейся алюминиевой крышкой с контролем первого вскрытия и с мерным пластиковым стаканчиком N 1; по 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и в недоступном для детей месте. Не использовать после истечения срока годности.

Срок годности: 3 года.

Порядок отпуска из аптек:

Препарат отпускается по рецепту врача.

Производитель:

СЕДЕЙТ Хелскэр (П) Лтд.

115-а, Вардхман Тауэр, Коммьюнити Центр, Притвихар, Дели - 110092 (Индия)

Претензии потребителей отправлять в адрес фирмы, ответственной за качество (фирма-владелец торговой марки):

ЗАО «Научно-производственный центр «ЭЛЬФА», Россия

109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 14

т/ф.: +7 (495) 785-51-30