

Стодал сироп инструкция по применению

Специально для сайта **MyKashel.ru**



Действующее вещество: Прочие комбинированные препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях

Лекарственная форма: Сироп

Фармакотерапевтическая группа: Комплексный гомеопатический препарат.

Состав

действующие вещества:

100 г сиропа содержат:

Pulsatilla 6CH..... 0,95 г;

Rumex crispus 6CH..... 0,95 г;

Bryonia 3CH..... 0,95 г;

Ipeca 3CH..... 0,95 г;

Spongia tosta 3CH..... 0,95 г;

Sticta pulmonaria 3CH..... 0,95 г;

Antimonium tartaricum 6CH..... 0,95 г;

Myocardium 6CH..... 0,95 г;

Coccus cacti 3CH..... 0,95 г;

Drosera MT..... 0,95 г;

вспомогательные вещества: сироп Толу, сироп Полигала, сироп сахарозы, карамель (E150), этанол 96% (1,74% v/v), кислота бензойная (E210).

Лекарственная форма

Сироп.

Основные физико-химические свойства: сиропобразной жидкостью, слегка опалесцентна, светлого желто-коричневого цвета с запахом бальзама Толу.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический средство.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. Фармакологические свойства препарата обусловлены комплексным действием активных компонентов, которые проявляют бронхолитическое, отхаркивающее, муколитическое действие. Стодаль® уменьшает вязкость мокроты, облегчает откашливание. Также проявляет увлажняющее действие при сухом кашле и уменьшает тягу к кашлю при спастическом и влажном кашле.

Фармакокинетика. Не изучалась.

Показания

Комплексное симптоматическое лечение продуктивного и непродуктивного кашля у взрослых и детей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующим или вспомогательным веществам препарата.

Пациенты с редкой наследственной проблемой непереносимости фруктозы, глюкозо-галактозной малабсорбцией или сахарозо-изомальтазной недостаточностью не должны принимать это средство.

Особые меры безопасности

Данная лекарственная форма содержит 1,74 % v/v спирта этилового

5 мл сиропа содержит 0,069 г спирта этилового и 3,75 г сахарозы.

15 мл сиропа содержит 0,206 г спирта этилового и 11,25 г сахарозы.

С осторожностью применять больным сахарным диабетом.

Группам повышенного риска, которые страдают болезнями печени либо эпилепсией, следует принимать во внимание наличие спирта в лекарственной форме. Не рекомендован для лиц, больных алкоголизмом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не выявлено.

Особенности применения

Применение в период беременности или кормления грудью. Поскольку препарат содержит спирт, его можно применять только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не выявлено.

Способ применения и дозы

Для перорального применения.

Взрослые: Разовая доза 15 мл (используя мерную чашку) 3-5 раз в сутки.

Дети в возрасте от 2 лет: разовая доза 5 мл (используя мерную чашку) 3-5 раз в сутки. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Побочные реакции

У лиц с повышенной чувствительностью к компонентам препарата возможны аллергические реакции, включая кожные высыпания.

Срок годности

5 лет.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте и вне поля зрения детей.

Хранить в оригинальной упаковке. Не требует особых условий хранения.

Упаковка

200 мл сиропа во флаконе янтарного цвета с белой крышечкой, которая навинчивается. Мерная чашка с делениями зафиксирована на крышечке сверху флакона. Картонная пачка с 1 флаконом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

БУАРОНА

Название и местонахождение производителя

Авеню де л'Уест Лионе, 2-Мессими 69510,

Франция.

Заявитель

БУАРОНА

Местонахождение заявителя

Авеню де л'Уест Лионе, 2-Мессими 69510,

Франция.