

СТОПТУССИН-ФИТО

Специально для сайта **MyKashel.ru**

Состав

100 г сиропа содержат:

Активные компоненты:

Тимьяна экстракт жидкий - 4,1666 г

Чабреца экстракт жидкий - 4,1666 г

Подорожника экстракт жидкий - 4,1666 г

Вспомогательные вещества:

мед очищенный, натрия бензоат, пропилпарабен, сахароза, вода очищенная.

Описание

Густой прозрачный сироп коричневого цвета с тимьяновым запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Фармакологические свойства

Препарат оказывает отхаркивающее, противовоспалительное действие, способствует снижению вязкости мокроты.

Показания к применению

В составе комплексной терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит, трахеобронхит).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, декомпенсация сердечной деятельности, заболевания печени и почек, детский возраст до 1 года, врожденная непереносимость фруктозы, нарушение усвоения глюкозы и галактозы; недостаток энзима, расщепляющего сахарозу и изомальтозу.

С осторожностью (вследствие наличия этанола в препарате): алкоголизм, эпилепсия, заболевания и травмы головного мозга.

Способ применения и дозы

Препарат назначается внутрь, после еды (в связи с возможностью снижения аппетита) Детям от 1 года до 5 лет - по 1/2-1 чайной ложке 2-3 раза в день, от 5 до 10 лет - по 1-2 чайные ложки 3 раза в день, от 10 до 15 лет - по 2-3 чайные ложки 3 раза в день, детям старше 15 лет и взрослым - по 1 столовой ложке 3-5 раз в день. Средний курс лечения - 7 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции



Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Стоптуссин-Фито не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Препарат содержит 3,4 % (объемн.) этанола; 1 чайная ложка (5 мл) содержит до 0,14 г этанола; 1 столовая ложка (15 мл) - до 0,41 г этанола.

Препарат следует с осторожностью назначать детям (из-за возможного негативного влияния этанола).

В составе препарата содержится 62% сахарозы, поэтому его следует с осторожностью применять больным сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов. В 1 чайной ложке препарата содержится до 3,1 г сахарозы, в 1 столовой ложке - до 9,3 г сахарозы.

Форма выпуска

Сироп; по 100 мл во флаконах темного стекла с мерным колпачком. Каждый флакон помещен вместе с инструкцией по применению в картонную коробку.

Условия хранения

При температуре от 10 до 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.